

acquistare vardenafil acquista vardenafil

Autor: GarryCoulombe - Wczoraj 05:28

Farmacia europea

Visita il nostro sito web per acquistare vardenafil

[Clicca qui – Vai in farmacia](#)

Order required: Nessuna prescrizione richiesta (nella nostra farmacia)

Disponibilità: In magazzino!

Informazioni dettagliate sui prodotti medici

Pillole bonus e grandi sconti su ogni ordine

La tua completa soddisfazione è garantita o ti rimborsiamo

Levitra ♦ responsabile per l'ampliamento e il rilassamento dei vasi sanguigni che portano il sangue al pene.

Levitra ♦ stato studiato dalla societ♦ farmaceutica Bayer/GlaxoSmithKline e usa Vardenafil HCl come il componente principale di questo farmaco. Levitra ♦ un medicinale preso per via enterale ed usato per trattamento della disfunzione erettile. Stimolazione sessuale causa produzione e rilascio dell'ossido nitrico dalle estremità nervose del corpo cavernoso del pene attivando così un'enzima di guanylate cyclase. En su turno guanylate cyclase ♦ responsabile di produzione di ciclico guanosine monophosphate (cGMP). Il cGMP causa effetto vasodilatatore e rilassamento di vasi sanguigni quali portano sangue al pene. Levitra previene che cGMP venga distrutto dall'enzima di phosphodiesterase-5 e così aiuta l'accesso dell'afflusso di sangue al pene.

La dose consigliata di Levitra di 10 mg giornalieri viene presa 1 ora prima del coito. Se nessun effetto collaterale ♦ stato osservato la dose pu♦ essere maggiorata fino 20 mg. Nel caso di avversi effetti la dose viene ridotta fino 5 mg giornalieri. Non prendete pi♦ di una pastiglia di Levitra al giorno.

Levitra non ♦ stato provato sui pazienti con malattia cardiovascolare, perciò ♦ sconsigliato che persone con insulto o insufficienza cardiaca, o attacco cardiaco nell'anamnesi (soprattutto durante 6 mesi precedenti) prendino Levitra. Prima di prendere Levitra informate il vostro medico se avete problemi renali o epatici, emorragie, ulcera di stomaco o disturbi di retina, come retinite pigmentosa, reazioni allergiche a questo farmaco o qualsiasi altro medicinale, deformazione del pene (incurvatura), fibrosi alveolare (malattia di Peyronie), ed anche malattie quali causano sviluppo di priapismo, anemia di emociti, mielome multiple, leucemia.

Levitra ♦ controindicato ai pazienti quali hanno ipersensibilità♦ a alcuni componenti di quest'ultimo o vengono curati con nitrati organici.

I pazienti minori di 16 anni o quali prendono inibitori di proteasi di HIV (ossia indinavir e ritonavir) non possono prendere il farmaco.

Ricerche simili: vardenafil senza ricetta vardenafil acquisto on line acquista vardenafil acquistare vardenafil vardenafil acquisto

Italia: Terni, Udine, Vittoria, San Prisco, Sant'Anastasia, Albisola Marina, Carnate, Novara, Benevento, La Spezia, Passo Corese, Ardea, Melzo, Agrate Brianza, Rovigo, Lurate Caccivio, Genoa, San Severo, Monserrato, Biassono, Settimo Torinese, Legnano, Reggio Emilia, Ferrara, Aprilia.

=====